

Tendencias de consumo de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos en una población colombiana

Verónica Alzate-Carvajal, Carlos Eduardo Jiménez-Canizales, Jorge Enrique Machado-Alba

Grupo de Investigación en Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia, Universidad Tecnológica de Pereira - Audifarma S.A.

Introducción: En Latinoamérica los psicofármacos son el tercer grupo de medicamentos más comercializados, especialmente antidepresivos (35%) y ansiolíticos (5%).

Objetivo. Determinar el comportamiento del consumo y los costos de los ansiolíticos e hipnóticos en una población de pacientes afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia.

Métodos: Estudio descriptivo observacional. Los datos para el análisis fueron las prescripciones de cualquier ansiolítico o hipnótico, realizadas a pacientes ambulatorios en el periodo comprendido entre enero de 2008 y diciembre de 2013 en una población de 3,5 millones de personas. Se consideraron variables sociodemográficas, farmacológicas, costos globales y costos por mil habitantes y día (CHD).

Resultados: El número de pacientes que recibieron los medicamentos estudiados varió de 11097 a 19231 entre 2008 y 2013. Los medicamentos más utilizados fueron clonazepam (44,1% de formulaciones), alprazolam (31,2%) y lorazepam (13,2%). El valor facturado de ansiolíticos pasó de US\$ 207.673,63 en 2008 a US\$ 488.977 en 2013, con un crecimiento del 135,4%. El CHD fue de US\$ 0,31 para las benzodiazepinas y US\$ 0,02 para los medicamentos "Z" para el 2008 y US\$ 0,36 y de US\$ 0,02 en el 2013 respectivamente. Los CHD se redujeron después del año 2010 tras la introducción de medicamentos genéricos.

Conclusión: Los pacientes que reciben benzodiazepinas en Colombia son en su mayoría mujeres, con 55 años de edad promedio, con muy baja frecuencia expresada en DHD al compararlo con otros países.

Palabras clave: Hipnóticos y sedantes; Ansiolíticos; Prescripciones de Medicamentos; Costos de la Atención en Salud; Costos en Drogas; Colombia. (fuente: DeCS)